


## La variété en bref

**Historique :** Inconnu à ce jour.


**Critères discriminants :** Cette variété présente un fruit de taille moyenne. Cette pomme possède une saveur peu aromatique et acidulée.

**Synonyme génétique:** Unique.




Pomme des Fahys, La Coudre, Neuchâtel A1404010, ACL K071, 17.09.2012

**Pomme des Fahys (La Coudre)**  
Appréciation générale: 6.2



Attribut	Score (sur 10)
Intensité de l'odeur	~4.5
Intensité de l'arôme	~4.5
Persistance du goût	~4.5
Sucré	~4.5
Acidité	~4.5
Astringence	~4.5
Consistance (fermeté) de la chair	~4.5
Croquant	~4.5
Jus	~4.5
Texture	~4.5



Pomme des Fahys, La Coudre A1404010, ACL K071, 17.09.2012

Dimension de la caisse : 30x40cm

## Légende :

n.é. = non évalué

## Pour en savoir plus :

[www.pgrel.admin.ch](http://www.pgrel.admin.ch)

[www.retropomme.ch](http://www.retropomme.ch)

## Bibliographie

Inventaire réalisé par Corbaz, R. (Ass. Arboretum d'Aubonne)

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE  
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme  
Pour la sauvegarde du patrimoine  
fruitier de Suisse Romande

**Description du fruit***Les dimensions*

Taille	moyenne
Poids (min)	62 [g]
Poids (max)	141 [g]
Hauteur (min)	41 [mm]
Hauteur (max)	57 [mm]
Diamètre (min)	53 [mm]
Diamètre (max)	74 [mm]
Forme	Sphérique aplatie
Taille du coeur	moyen

*Les couleurs*

de fond	vert
de recouvrement importance	forte jusqu'à 3/4 du fruit
de recouvrement répartition	striée
de recouvrement couleur	rouge violacé

*Les Roussissures*

Position	autour du pédoncule
Intensité	faible jusqu'à 1/4

*Les lenticelles*

Ponctuation	ponctuées
Taille	petites

**Description Organoleptique**

Intensité de l'odeur	faible à moyenne
Intensité de l'arôme	moyenne à élevée
Persistance du goût	faible à moyenne
Sucré	faible à moyenne
Acidité	moyenne
Astringence	très faible
Fermeté de la chair	ferme
Jutosité	moyenne
Texture de la chair	croquante
Épaisseur de la peau	moyenne à épaisse
Nature de la saveur	peu aromatique
Équilibre acide-sucre	acidulée
Appréciation générale	moyenne à bonne





**Description de l'arbre**

Port de l'arbre	retombant
Vigueur	moyenne
Ramification	faible
Densité des brindilles	moyenne
Floraison relative	moyenne à tardive
Charge	importante
Maturité relative	précoce à moyenne

**Remarques :****Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Jusqu'à février en cave naturelle.

**Utilisations traditionnelles & conseils :****Phénologie**

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation	

