

## La variété en bref

**Historique :** On écrit More de Boeuf en 1806 à Cormondrèche. Le nom de cette variété retrouvée à Fresens signifie museau de boeuf.

**Critères discriminants :** Cette variété présente une pomme de grosse taille à la saveur aromatique et acidulée.

**Synonyme génétique:** Unique.



Pomme Morre de Boeuf, Fresens

R14000277, ACL L027-28, 24.10.2011

## Légende :

n.é. = non évalué

## Pour en savoir plus :

[www.pgrel.admin.ch](http://www.pgrel.admin.ch)

[www.retropomme.ch](http://www.retropomme.ch)

## Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Pomme Morre de Boeuf, Fresens

R14000277, ACL L027-28, 10.10.2012

Dimension de la caisse : 30x40cm



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE  
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme  
Pour la sauvegarde du patrimoine  
fruitier de Suisse Romande

**Description du fruit***Les dimensions*

Taille	grosse
Poids (min)	104 [g]
Poids (max)	277 [g]
Hauteur (min)	55 [mm]
Hauteur (max)	81 [mm]
Diamètre (min)	58 [mm]
Diamètre (max)	85 [mm]
Forme	Tronconique
Taille du coeur	moyen

*Les couleurs*

de fond	vert
de recouvrement importance	moyenne jusqu'à 1/2 du fruit
de recouvrement répartition	lavée (délavée estompée)
de recouvrement couleur	rosée

*Les Roussissures*

Position	autour du pédoncule
Intensité	faible jusqu'à 1/4

*Les lenticelles*

Ponctuation	moyennement ponctuées
Taille	moyennes

**Description Organoleptique**

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	faible à moyenne
Acidité	moyenne
Astringence	manquant
Fermeté de la chair	moyenne
Jutosité	juteuse
Texture de la chair	friable
Épaisseur de la peau	moyenne
Nature de la saveur	aromatique
Équilibre acide-sucre	acidulée
Appréciation générale	n.é.

**Description de l'arbre**


Port de l'arbre	érigé
Vigueur	forte
Ramification	n.é.
Densité des brindilles	n.é.
Floraison relative	Moyenne
Charge	moyenne
Maturité relative	tardive

**Remarques :****Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Jusqu'à début mars en cave naturelle.

**Utilisations traditionnelles & conseils :****Phénologie**

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation	



Variété de référence : Pomme Golden Delicious