

Fiche Variétale

# Pomme Buppicher

Guggisberg (FR) - CHE

N° d'inventaire : F14050609

N° PLCODE : 14-001-172

N° PUIACC : A000002431

N° famille génétique : 984

## La variété en bref

**Historique :** Inconnu à ce jour.

**Critères discriminants :** Cette variété présente un fruit de moyenne à grosse taille. Cette pomme possède une saveur équilibrée et peu aromatique. Cette variété est adaptée à l'altitude (1283m).


**Synonyme génétique:** Unique.



Pomme Buppicher, Guggisberg

F14050609, ACL L045-46, 05.09.2012

### Pomme Buppicher (Guggisberg)



## Légende :

n.é. = non évalué

## Pour en savoir plus :

[www.pgrel.admin.ch](http://www.pgrel.admin.ch)

[www.retropomme.ch](http://www.retropomme.ch)

## Bibliographie

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 09.2022



Pomme Buppicher, Guggisberg

F14050609, ACL L45-46, 05.09.2012

Dimension de la caisse : 30x40cm



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE  
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme  
Pour la sauvegarde du patrimoine  
fruitier de Suisse Romande

**Description du fruit***Les dimensions*

Taille	moyenne à grosse
Poids (min)	111 [g]
Poids (max)	438 [g]
Hauteur (min)	57 [mm]
Hauteur (max)	79 [mm]
Diamètre (min)	54 [mm]
Diamètre (max)	84 [mm]
Forme	Tronconique
Taille du coeur	petit

*Les couleurs*

de fond	vert blanchâtre
de recouvrement importance	forte jusqu'à 3/4 du fruit
de recouvrement répartition	voilée (flamée)
de recouvrement couleur	rouge

*Les Roussissures*

Position	autour du pédoncule
Intensité	faible jusqu'à 1/4

*Les lenticelles*

Ponctuation	moyennement ponctuées
Taille	moyennes

**Description Organoleptique**

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	faible à moyenne
Acidité	faible à moyenne
Astringence	très faible
Fermeté de la chair	tendre à moyenne
Jutosité	moyenne à juteuse
Texture de la chair	friable
Épaisseur de la peau	moyenne à épaisse
Nature de la saveur	peu aromatique
Équilibre acide-sucre	équilibrée
Appréciation générale	n.é.

**Description de l'arbre**

Port de l'arbre	érigé à étalé
Vigueur	moyenne à forte
Ramification	moyenne
Densité des brindilles	moyenne
Floraison relative	précoce à moyenne
Charge	importante
Maturité relative	moyenne

**Remarques :****Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :****Utilisations traditionnelles & conseils :****Phénologie**

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation	

