

La variété en bref

Historique : Inconnu à ce jour.

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de très grande taille. Cette pomme possède une saveur parfumée et acidulée.

Synonyme génétique: *Freiämter Roteapfel; Schöner von Kent; Prinzenapfel; Schmutzacker.*




Pomme Belle de Ballaigues, Région du Jura

A1404001, ACL K061-62, 31.08.2010

Pomme Belle de Ballaigues (Ballaigues)

Appréciation générale : 5.4



Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch

www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par Corbaz, R. (Ass. Arboretum d'Aubonne)

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Pomme Belle de Ballaigues, Vallon de l'Aubonne

A1404001, ACL K061-62, 07.09.2010

Dimension de la caisse : 30x40cm



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille	très grosse
Poids (min)	154 [g]
Poids (max)	426 [g]
Hauteur (min)	68 [mm]
Hauteur (max)	105 [mm]
Diamètre (min)	71 [mm]
Diamètre (max)	98 [mm]
Forme	Rectangulaire
Taille du coeur	moyen

Les couleurs

de fond	vert blanchâtre
de recouvrement importance	forte jusqu'à 3/4 du fruit
de recouvrement répartition	voilée (flamée)
de recouvrement couleur	rouge

Les Roussissures

Position	autour du pédoncule
Intensité	moyenne jusqu'à 1/2

Les lenticelles

Ponctuation	peu ponctuées
Taille	petites à moyennes






Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	moyenne
Intensité de l'arôme	moyenne à élevée
Persistance du goût	moyenne
Sucré	faible à moyenne
Acidité	moyenne à élevée
Astringence	manquant
Fermeté de la chair	tendre à moyenne
Jutosité	moyenne à juteuse
Texture de la chair	friable
Épaisseur de la peau	moyenne à épaisse
Nature de la saveur	parfumée
Équilibre acide-sucre	acidulée
Appréciation générale	moyenne

Description de l'arbre

Port de l'arbre	étalé
Vigueur	forte à très forte
Ramification	moyenne
Densité des brindilles	moyenne à forte
Floraison relative	précoce à moyenne
Charge	n.é.
Maturité relative	précoce à moyenne

Remarques :**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :****Utilisations traditionnelles & conseils :****Phénologie**

	Débourèvement		Floraison stade F1
	Floraison stade F2		Cueillette
	Consommation & conservation		

