

La variété en bref

Historique : Inconnu à ce jour.

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit peu aromatique à la saveur douce. La chair est assez juteuse et fine. C'est un bon fruit de table avec de bonnes aptitudes pour la cuisson et l'élaboration de jus. Le fruit se conserve bien en cave naturelle. Cette variété montre une bonne résistance aux maladies.

Synonyme génétique: Belle Fille de l'Indre; Rambour franc Capel de Prevet; Menznauer Jäger; Altenburger; Augschteiler Typ Reiat; Gurwolferrainette; Kirchhöfler; Winterrambour.

Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch


www.retopomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.


Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Pomme Chasseur de Menznau, Payerne: Corges

R14000239, ACL K017-18, 18.10.2013



Pomme Chasseur de Menznau, Corges

R14000238, ACL K017-18, 17.10.2013

Dimension de la caisse : 30x40cm



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille	moyenne à grosse
Poids (min)	73 [g]
Poids (max)	190 [g]
Hauteur (min)	41 [mm]
Hauteur (max)	63 [mm]
Diamètre (min)	49 [mm]
Diamètre (max)	82 [mm]
Forme	Ventruée vers le pédoncule
Taille du coeur	moyen

Les couleurs

de fond	vert
de recouvrement importance	forte à très forte
de recouvrement répartition	voilée (flamée)
de recouvrement couleur	rouge foncé

Les Roussissures

Position	autour du pédoncule
Intensité	faible jusqu'à 1/4

Les lenticelles

Ponctuation	moyennement ponctuées
Taille	petites

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	élevée à très élevée
Intensité de l'arôme	élevée
Persistance du goût	élevée
Sucré	élevée
Acidité	très faible
Astringence	manquant
Fermeté de la chair	moyenne
Jutosité	moyenne à juteuse
Texture de la chair	fine
Épaisseur de la peau	épaisse
Nature de la saveur	peu aromatique
Équilibre acide-sucre	douce
Appréciation générale	assez bonne

Description de l'arbre

Port de l'arbre	étalé
Vigueur	faible
Ramification	moyenne
Densité des brindilles	n.é.
Floraison relative	Moyenne
Charge	moyenne
Maturité relative	moyenne

Remarques :

Mise à fruit moyenne. Peu alternante. Peu sensible à la tavelure et à l'oïdium.

Conservation et conseils d'utilisation**Conservation :**

Février en cave naturelle.

Utilisations traditionnelles & conseils :

Bon fruit de table avec des aptitudes pour la cuisson et l'élaboration de jus

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation	

