

La variété en bref

Historique : Inconnu à ce jour.

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de grande à très grande taille. Comme son nom l'indique, ce fruit est particulièrement adapté à la cuisson.


Synonyme génétique: Hütler; National; Prince Albert.



Pomme Cuisinière, Malapalud

R14040457, ACL L067-68, 23.10.2013

Pomme Cuisinière (Malapalud)



Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch

www.retopomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Pomme Cuisinière; Malapalud

R14040457, ACL L067-68, 17.10.2013

Dimension de la caisse : 30x40cm



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille	grosse à très grosse
Poids (min)	101 [g]
Poids (max)	385 [g]
Hauteur (min)	53 [mm]
Hauteur (max)	89 [mm]
Diamètre (min)	62 [mm]
Diamètre (max)	98 [mm]
Forme	Ventruée vers le pédoncule
Taille du coeur	moyen à grand

Les couleurs

de fond	vert
de recouvrement importance	moyenne jusqu'à 1/2 du fruit
de recouvrement répartition	striée
de recouvrement couleur	rouge

Les Roussissures

Position	autour du pédoncule
Intensité	faible jusqu'à 1/4

Les lenticelles

Ponctuation	moyennement ponctuées
Taille	moyennes

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	faible à moyenne
Acidité	moyenne
Astringence	très faible
Fermeté de la chair	moyenne à ferme
Jutosité	moyenne à juteuse
Texture de la chair	friable
Épaisseur de la peau	moyenne à épaisse
Nature de la saveur	peu aromatique
Équilibre acide-sucre	acidulée
Appréciation générale	n.é.

Description de l'arbre

Port de l'arbre	retombant à pleureur
Vigueur	moyenne à forte
Ramification	forte
Densité des brindilles	forte
Floraison relative	moyenne à tardive
Charge	n.é.
Maturité relative	n.é.

Remarques :**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :****Utilisations traditionnelles & conseils :**

Comme son nom l'indique, ce fruit est particulièrement adapté à la cuisson.

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation	

