Fiche Variétale

Pomme Villeneuve

Ollon: Glutières (VD) - CHE

N° d'inventaire: R14040587 N° PLCODE: 14-001-2574 N° PUIACC: A0000037188 N° famille génétique : 180

La variété en bref

Historique: Inconnu à ce jour.

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de taille moyenne à grande. Cette pomme possède une saveur peu aromatique et douce à la chaire croquante. Elle se dégustait traditionnellement sous forme de séchons.

Synonyme génétique: Pfyner; Rosenapfel; Roter Fresquin; Räuchli; Winterastrachan; Gustavs Dauerapfel.

Légende:

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus:


www.pgrel.admin.ch www.retropomme.ch


Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA: Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version: 01.2023







Rétropomme

Pour la sauvgarde du patrimoine fruitier de Suisse Romande

Dimension de la caissette : 30x40cm

Fiche Variétale

Pomme Villeneuve

Ollon: Glutières (VD)

N° d'inventaire : R14040587 N° PLCODE : 14-001-2574 N° PUIACC : A0000037188 N° famille génétique : 180

Description du fruit

Les dimensions	
Taille	moyenne à grosse
Poids (min)	72 [g]
Poids (max)	174 [g]
Hauteur (min)	47 [mm]
Hauteur (max)	66 [mm]
Diamètre (min)	55 [mm]
Diamètre (max)	76 [mm]
Forme	Sphérique à conique
Taille du choeur	moyen

Les couleurs

de fond	iaune vert
ac iona	jaune vert

de recouvrement importance ____ forte jusqu'à 3/4 du fruit de recouvrement répartition ____ lavée (délavée estompée)

de recouvrement couleur rouge

Les Roussissures

Position	autour du pédoncule
Intensité	forte jusqu'à 3/4

Les lenticelles

Ponctuation	moyennement ponctuées
Taille	movennes

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	moyenne à élevée
Acidité	faible
Astringence	très faible
Fermeté de la chair	moyenne
Jutosité	moyenne
Texture de la chair	croquante
Épaisseur de la peau	moyenne à épaisse
Nature de la saveur r	peu aromatique
Équilibre acide-sucre	douce
Appréciation générale	n.é.

Description de l'arbre

Port de l'arbre	étalé
Vigueur	moyenne
Ramification	forte
Densité des brindilles	moyenne
Floraison relative	n.é.
Charge	importante
Maturité relative	tardive

Remarques:

Conservation et conseils d'utilisation

Conservation:

Jusqu'au début d'avril.

Utilisations traditionnelles & conseils:

Ce fruit servait à confectionner des séchons.

Phénologie

Débourement	Floraison stade F1
Floraison stade F2	Cueillette
Consommation & c	onservation

Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai