

Pomme à Beignet

Montalchez : les Prises (NE) - CHE

N° d'inventaire : R14000218

N° PLCODE : 14-001-3195

N° PUIACC : A0000047936

N° famille génétique : 744

La variété en bref

Historique : Vers 1690, une Pomme à Bugnet existe à Montreux . En 1884 au pied du Jura vaudois, la Pomme à Beignet est « grosse, verte, aplatie et mûre en hiver »

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de taille grosse à très grosse. Cette pomme se conserve longtemps en cave naturelle (jusqu'à mi-mars). C'est un bon fruit de cuisson mais qui peut être aussi consommée comme fruit de table à la saveur aromatique et à la chair tendre. De plus, cette variété montre une bonne résistance aux maladies et elle est adaptée à l'altitude (904m).

Synonyme génétique: Reinette d'Arlesheim ; Winterzitron.

Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgradmin.ch


www.retopomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille	grosse à très grosse
Poids (min)	170 [g]
Poids (max)	274 [g]
Hauteur (min)	59 [mm]
Hauteur (max)	81 [mm]
Diamètre (min)	76 [mm]
Diamètre (max)	92 [mm]
Forme	Ventruée vers le pédoncule
Taille du coeur	petit à moyen

Les couleurs

de fond	vert
de recouvrement importance	forte jusqu'à 3/4 du fruit
de recouvrement répartition	voilée (flamée)
de recouvrement couleur	rouge

Les Roussissures

Position	autour du pédoncule
Intensité	forte jusqu'à 3/4

Les lenticelles

Ponctuation	peu ponctuées
Taille	petites à moyennes

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	moyenne
Intensité de l'arôme	moyenne
Persistance du goût	moyenne
Sucré	moyenne
Acidité	faible
Astringence	manquant
Fermeté de la chair	tendre à moyenne
Jutosité	moyenne
Texture de la chair	friable
Épaisseur de la peau	épaisse
Nature de la saveur	aromatique
Équilibre acide-sucre	équilibrée
Appréciation générale	assez bonne

Description de l'arbre

Port de l'arbre	étalé
Vigueur	forte
Ramification	forte
Densité des brindilles	faible
Floraison relative	précoce à moyenne
Charge	importante
Maturité relative	moyenne à tardive

Remarques :

Tendance à l'alternance moyenne. Mise à fruit moyennement précoce. Peu sensible à la tavelure et à l'oïdium






Conservation et conseils d'utilisation**Conservation :**

Février en cave naturelle

Utilisations traditionnelles & conseils :

Nous la conseillons, comme son nom le laisse entendre, pour la cuisson. Elle peut également être consommée comme fruit de table

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation	

