

Prune Bacon

Saint-Légier (VD) - CHE

N° d'inventaire : R11000308

N° PLCODE : 14-010-8

N° PUIACC : A000021320

N° famille génétique : 34

La variété en bref

Historique : Le mot Bacon signifie lard en Suisse romande. Vers 1900 dans le canton de Fribourg, « Bacouna » est en effet synonyme de « pronma à Cayon » soit Prune à Cochon.

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de petite taille. Cette prune possède une saveur aromatique et douce. Traditionnellement destinée à fourrager les cochons, nous la conseillons comme fruit de table ou de transformation.

Synonyme génétique: Prune Baconnet; Bacoune (Aumont), (Vuadens), (Cousset), (Vaulruz).

Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch


www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille du fruit	petite
Hauteur (min)	26 [mm]
Hauteur (max)	31 [mm]
Largeur (min)	24 [mm]
Largeur (max)	30 [mm]
Poids de 20 fruits	259 à 265 [g]
Forme	Sphérique (globuleuse)
Longueur du pédoncule	court < 15 mm
Épaisseur du pédoncule	fin

Les couleurs

Du fond	orange
Secondaires	violet
De la chair	orange
De la pruine	blanche

Les détails discriminants

Profondeur du sillon ventral	nul
Taille relative du noyau	petit à moyen
Détachement du noyau	moyennement adhérent
Importance de la pruine	moyenne

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	moyenne à élevée
Acidité	faible à moyenne
Fermeté de la chair	moyenne
Jutosité	moyenne
Épaisseur de la peau	moyenne
Nature de la saveur	aromatique
Équilibre acide-sucre	douce
Appréciation générale	n.é.

Description de l'arbre

Port de l'arbre	étalé
Vigueur	moyenne
Ramification	moyenne
Densité des brindilles	moyenne
Floraison relative	moyenne à tardive
Charge	petite
Maturité relative	moyenne

Remarques :

.

Conservation et conseils d'utilisation**Conservation :**

Les prunes sont à consommer ou transformer rapidement après la récolte.

Utilisations traditionnelles & conseils :

Traditionnellement destinée à fourrager les cochons, nous la conseillons comme fruit de table ou de transformation.

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.



Variété de référence : Prune Reine-Claude Verte