

La variété en bref

Historique :

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de petite taille. Cette prune possède une saveur aromatique et équilibrée.

Synonyme génétique: Unique.

Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch

www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par Corbaz, R. (Ass. Arboretum d'Aubonne)

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.


Version : 01.2023



Prune Coco, (prune jaune)

A1104039, ACL B013-14, 02.09.2013

Prune Coco (prune jaune)



Prune Coco, (prune jaune)

A1104039, ACL B013-14, 25.07.2011

Dimension de la caisse : 20x30cm



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille du fruit	petite
Hauteur (min)	32 [mm]
Hauteur (max)	40 [mm]
Largeur (min)	27 [mm]
Largeur (max)	36 [mm]
Poids de 20 fruits	391 à 471 [g]
Forme	Cordiforme
Longueur du pédoncule	long > 20 mm
Épaisseur du pédoncule	moyen

Les couleurs

Du fond	jaune vert
Secondaires	orange
De la chair	orange
De la prune	blanche

Les détails discriminants

Profondeur du sillon ventral	faible
Taille relative du noyau	moyen
Détachement du noyau	libre
Importance de la prune	importante

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	moyenne
Acidité	faible à moyenne
Fermeté de la chair	moyenne
Jutosité	sèche à moyenne
Épaisseur de la peau	moyenne
Nature de la saveur	aromatique
Équilibre acide-sucre	équilibrée
Appréciation générale	n.é.

Description de l'arbre

Port de l'arbre	étalé
Vigueur	forte à très forte
Ramification	moyenne
Densité des brindilles	moyenne
Floraison relative	tardive
Charge	n.é.
Maturité relative	moyenne à tardive

Remarques :**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Les prunes sont à consommer ou transformer rapidement après la récolte.

Utilisations traditionnelles & conseils :**Phénologie**

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette

