


La variété en bref

Historique : *Naguère répandu à Fresens. C'est une sorte de Bérudge.*

Critères discriminants : *Cette variété présente un fruit de petite taille. Cette prune possède une saveur peu aromatique et équilibrée. Elle est bien adaptée à la confection de tarte.*

Synonyme génétique: *Vielle Prune.*



Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch

www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

| | |
|------------------------|---------------|
| Taille du fruit | petite |
| Hauteur (min) | 25 [mm] |
| Hauteur (max) | 37 [mm] |
| Largeur (min) | 25 [mm] |
| Largeur (max) | 34 [mm] |
| Poids de 20 fruits | 162 à 340 [g] |
| Forme | Ovale |
| Longueur du pédoncule | court < 15 mm |
| Épaisseur du pédoncule | moyen |

Les couleurs

| | |
|-------------|---------|
| Du fond | orange |
| Secondaires | violet |
| De la chair | orange |
| De la prune | blanche |

Les détails discriminants

| | |
|------------------------------|--------|
| Profondeur du sillon ventral | nul |
| Taille relative du noyau | moyen |
| Détachement du noyau | libre |
| Importance de la prune | faible |

Description Organoleptique

| | |
|-----------------------|------------------|
| Intensité de l'odeur | |
| Intensité de l'arôme | |
| Persistance du goût | |
| Sucré | faible à moyenne |
| Acidité | faible |
| Fermeté de la chair | tendre |
| Jutosité | sèche |
| Épaisseur de la peau | moyenne |
| Nature de la saveur | peu aromatique |
| Équilibre acide-sucre | équilibrée |
| Appréciation générale | |

Description de l'arbre

| | |
|------------------------|-------------------|
| Port de l'arbre | érigé |
| Vigueur | moyenne |
| Ramification | moyenne |
| Densité des brindilles | forte |
| Floraison relative | moyenne à tardive |
| Charge | |
| Maturité relative | précoce |

Remarques :**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Les prunes sont à consommer ou transformer rapidement après la récolte.

Utilisations traditionnelles & conseils :

Le fruit tenu pour farineux est particulièrement destiné à la confection de gâteaux.

Phénologie

| | |
|--|--|
|  Débourèvement |  Floraison stade F1 |
|  Floraison stade F2 |  Cueillette |

