

Prune - Pêche

Saint-Aubin (NE) - CHE

N° d'inventaire : R11000338

N° PLCODE : 14-010-135

N° PUIACC : A0000021410


N° famille génétique : 122

La variété en bref

Historique : Cette variété a été beaucoup plantée avant 1950.

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de moyenne à grande taille. Cette prune possède une saveur peu aromatique et légèrement douce.

Synonyme génétique: Brunollen, Prune Madeleine, Prune à Bacon, Prune Marie, Tintenapfel, Fimmelsberger Pflaume, Pfirsichpflaume.



Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch


www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille du fruit	moyenne à grosse
Hauteur (min)	36 [mm]
Hauteur (max)	47 [mm]
Largeur (min)	36 [mm]
Largeur (max)	47 [mm]
Poids de 20 fruits	623 à 976 [g]
Forme	Sphérique (globuleuse)
Longueur du pédoncule	court < 15 mm
Épaisseur du pédoncule	moyen

Les couleurs

Du fond	purpurine
Secondaires	rouge
De la chair	jaune
De la pruine	blanche

Les détails discriminants

Profondeur du sillon ventral	faible
Taille relative du noyau	petit
Détachement du noyau	moyennement adhérent
Importance de la pruine	faible à moyenne

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	moyenne à élevée
Acidité	très faible
Fermeté de la chair	moyenne
Jutosité	moyenne à juteuse
Épaisseur de la peau	fine
Nature de la saveur	peu aromatique
Équilibre acide-sucre	légèrement douce
Appréciation générale	n.é.

Description de l'arbre

Port de l'arbre	érigé
Vigueur	moyenne
Ramification	moyenne
Densité des brindilles	moyenne
Floraison relative	moyenne à tardive
Charge	n.é.
Maturité relative	très précoce à précoce

Remarques :**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Les prunes sont à consommer ou transformer rapidement après la récolte.

Utilisations traditionnelles & conseils :**Phénologie**

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette

