

La variété en bref

Historique : Sous le nom de Pruneau de Saint-Aubin ou Bleu de Saint-Aubin (Saint-Aubin FR), ce fruit est abondamment cultivé entre Chabrey et Grandcour, ainsi qu'à Russy. Variété aussi dénommée sous le nom de prune Tsevesque.

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de petite taille. Ce pruneau possède une saveur aromatique et légèrement douce. C'est un fruit idéal pour le séchage car ces derniers peuvent sécher sur l'arbre et être récoltés jusqu'à Mi-novembre. Ce pruneau convient aussi pour les compotes ou les tartes. La récolte est donc tardive.

Synonyme génétique: Prune Tsevesque, des Vignes, Blaue Zuckerzweischge, Eyholzer, Brunner, Schöne von Bibern, pruneau de la Broye, Lohnemer, Basler Hauszweischge.

Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch


www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille du fruit	petite
Hauteur (min)	32 [mm]
Hauteur (max)	44 [mm]
Largeur (min)	22 [mm]
Largeur (max)	33 [mm]
Poids de 20 fruits	252 à 418 [g]
Forme	Elliptique allongée
Longueur du pédoncule	court < 15 mm
Épaisseur du pédoncule	fin

Les couleurs

Du fond	bleu foncé
Secondaires	violet
De la chair	jaune
De la prune	bleue

Les détails discriminants

Profondeur du sillon ventral	nul
Taille relative du noyau	moyen
Détachement du noyau	libre
Importance de la prune	importante

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	
Intensité de l'arôme	
Persistance du goût	
Sucré	élevée
Acidité	faible à moyenne
Fermeté de la chair	tendre à moyenne
Jutosité	sèche à moyenne
Épaisseur de la peau	moyenne
Nature de la saveur	aromatique
Équilibre acide-sucre	légèrement douce
Appréciation générale	

Description de l'arbre

Port de l'arbre	érigé à étalé
Vigueur	forte
Ramification	forte
Densité des brindilles	moyenne
Floraison relative	très tardive
Charge	importante
Maturité relative	tardive à très tardive

Remarques :**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Les prunes sont à consommer ou transformer rapidement après la récolte.

Utilisations traditionnelles & conseils :

Traditionnellement, cette prune était cuite en compote avec du vin et de la cannelle ou séchée.

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette

