

## La variété en bref

**Historique :** L'appellation Poire à Botsi s'applique à des variétés de petite grosseurs, douces et sucrées mûrissant vers la mi-septembre

**Critères discriminants :** Cette variété présente un fruit de petite à moyenne taille. Cette poire possède une saveur aromatique et équilibrée. Cette poire se déguste de diverses manières une fois transformée (cuite avec de la viande, vin-cuit, distillation, en sirops). Cette variété est très précoce et le blettissement du fruit est rapide. Cette variété est relativement résistante aux maladies.

**Synonyme génétique:** Botzi Jaune, Botzi Rouge, Böztris, (Grüne) Büschelbirne, Verde, Epine (Prez-vers-Siviriez).

## Légende :

n.é. = non évalué

## Pour en savoir plus :

[www.pgrel.admin.ch](http://www.pgrel.admin.ch)

[www.retropomme.ch](http://www.retropomme.ch)

## Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.


Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Poire à Botsi, Chatonnaye

R13000062, NEU Q021-22, 22.08.2011



Poire à Botsi, Châtonnaye

R13000062, NEU Q021-22, 22.08.2011

Dimension de la caisse : 30x40cm



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE  
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme  
Pour la sauvegarde du patrimoine  
fruitier de Suisse Romande

**Description du fruit***Les dimensions*

Taille	petite à moyenne
Poids (min)	48 [g]
Poids (max)	116 [g]
Hauteur (min)	44 [mm]
Hauteur (max)	65 [mm]
Diamètre (min)	44 [mm]
Diamètre (max)	61 [mm]
Forme	turbinée
Pierrosité	faible

*Les couleurs*

de fond	jaune vert
de recouvrement importance	moyenne jusqu'à 1/2 du fruit
de recouvrement répartition	lavée (délavée estompée)
de recouvrement couleur	orange

*Les Roussissures*

Position	sur tout le fruit
Intensité	faible à moyenne

*Les lenticelles*

Ponctuation	ponctuées
Taille	petites

**Description Organoleptique**

Intensité de l'odeur	élevée
Intensité de l'arôme	moyenne
Persistance du goût	longue
Sucré	faible à moyenne
Acidité	faible
Astringence	faible
Fermeté de la chair	tendre
Jutosité	sèche
Texture de la chair	friable
Épaisseur de la peau	moyenne
Nature de la saveur	aromatique
Équilibre acide-sucre	équilibrée
Appréciation générale	moyenne

**Description de l'arbre**

Port de l'arbre	fastigié à érigé
Vigueur	forte
Ramification	faible à moyenne
Densité des brindilles	faible à moyenne
Floraison relative	précoce à moyenne
Charge	moyenne à importante
Maturité relative	précoce à moyenne

**Remarques :**

Cette variété tend à l'alternance. Mise à fruit tardive. Relativement résistant à la tavelure (feuille et fruit). Peu sensible à la rouille grillagée sur feuille, relativement résistant à la rouille grillagée sur fruit. Relativement résistant au pseudomonas. Fructification en mouchet aux extrémités des branches.






**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Consommation ou transformation dès la récolte.  
Conservation jusqu'à fin septembre (cave naturelle)

**Utilisations traditionnelles & conseils :**

Fruit par excellence de la Bénichon (cuite avec du mouton). Variété très polyvalente (cuite en dessert, distillation, vin-cuit, etc.)

**Phénologie**

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation (cave naturelle)	

