

Poire Froment

Le Locum, Chablais (74) - FRA

N° d'inventaire : R13000118

N° PLCODE : 14-003-1125

N° PUIACC : A000024047


N° famille génétique : 621

La variété en bref

Historique : L'appellation Poire Froment se rapporte certainement à la couleur brune des fruits qu'elle désigne.

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de petite à moyenne taille. Cette poire possède une saveur parfumée et . Traditionnellement, On séchait ce fruit entier. Cette variété montre une relative bonne résistance aux maladies.

Synonyme génétique: Unique.



Dimension de la caisse : 30x40cm

Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch

www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 09.2022



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille	petite à moyenne
Poids (min)	22 [g]
Poids (max)	95 [g]
Hauteur (min)	36 [mm]
Hauteur (max)	61 [mm]
Diamètre (min)	34 [mm]
Diamètre (max)	58 [mm]
Forme	turbinée aplatie
Pierrosité	faible

Les couleurs

de fond	vert
de recouvrement importance	absente
de recouvrement répartition	
de recouvrement couleur	

Les Roussissures

Position	sur tout le fruit
Intensité	forte à très forte

Les lenticelles

Ponctuation	ponctuées
Taille	petites

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	élevée à très élevée
Acidité	très faible
Astringence	manquant
Fermeté de la chair	ferme
Jutosité	moyenne
Texture de la chair	friable
Épaisseur de la peau	moyenne
Nature de la saveur	parfumée
Équilibre acide-sucre	
Appréciation générale	n.é.

Description de l'arbre

Port de l'arbre	érigé à étalé
Vigueur	moyenne
Ramification	faible
Densité des brindilles	faible
Floraison relative	précoce à moyenne
Charge	importante
Maturité relative	précoce

Remarques :

Relativement résistant à la tavelure (feuille et fruit). Peu sensible à la rouille grillagée (feuille et fruit). Relativement résistant au pseudomonas.






Conservation et conseils d'utilisation**Conservation :**

Consommation ou transformation dès la récolte
Conservation jusqu'à début octobre (cave naturelle)

Utilisations traditionnelles & conseils :

Traditionnellement, On séchait ce fruit entier.

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation (cave naturelle)	

