

La variété en bref

Historique : Ce fruit de Charmoille, appelé également " Eierpir ". Il ressemble à une autre variété de la même région, la poire Spitzgüigi.

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de petite à moyenne taille. Cette poire possède une saveur aromatique et très douce. Ce fruit est excellent pour le séchage, les compotes et les conserves. Il se laisse aussi manger en fruit de table. La maturité du fruit est très précoce (fin juillet à mi-août) et il est à transformer dans le mois qui suit. Cette variété montre une relative bonne résistance aux maladies.

Synonyme génétique: Eyrepire.

Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgradmin.ch


www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Description du fruit*Les dimensions*

Taille	petite à moyenne
Poids (min)	44 [g]
Poids (max)	90 [g]
Hauteur (min)	52 [mm]
Hauteur (max)	74 [mm]
Diamètre (min)	40 [mm]
Diamètre (max)	52 [mm]
Forme	en forme de tonneau
Pierrosité	moyenne

Les couleurs

de fond	jaune
de recouvrement importance	moyenne jusqu'à 1/2 du fruit
de recouvrement répartition	lavée (délavée estompée)
de recouvrement couleur	rouge

Les Roussissures

Position	autour du pédoncule
Intensité	moyenne jusqu'à 1/2

Les lenticelles

Ponctuation	ponctuées
Taille	petites

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	élevée
Intensité de l'arôme	moyenne
Persistance du goût	longue
Sucré	moyenne à élevée
Acidité	faible
Astringence	très faible
Fermeté de la chair	moyenne
Jutosité	moyenne
Texture de la chair	friable
Épaisseur de la peau	moyenne
Nature de la saveur	aromatique
Équilibre acide-sucre	très douce
Appréciation générale	moyenne à bonne

Description de l'arbre

Port de l'arbre	érigé
Vigueur	forte à très forte
Ramification	moyenne
Densité des brindilles	moyenne à forte
Floraison relative	précoce à moyenne
Charge	moyenne à importante
Maturité relative	très précoce à précoce

Remarques :

Relativement résistant à la tavelure (feuille et fruit). Moyennement sensible à la rouille grillagée sur feuille, relativement résistant à la rouille grillagée sur fruit. Moyennement sensible au pseudomonas. Variété diploïde, bon pollen, fertilité 95%.

Conservation et conseils d'utilisation**Conservation :**

Consommation ou transformation dès la récolte. Conservation jusqu'à mi-octobre (cave naturelle)

Utilisations traditionnelles & conseils :

Ce fruit est excellent pour le séchage, les compotes et les conserves

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation (cave naturelle)	

