

Fiche Variétale

Poire Saint-Laurent II

Conthey: Aven (VS) - CHE

N° d'inventaire : R13030391

N° PLCODE : 14-003-1158

N° PUIACC : A0000024078

N° famille génétique : 144

La variété en bref

Historique :

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de petite taille. Cette poire possède une saveur aromatique et équilibrée. Des arômes fruités de melon et d'agrumes sont perceptibles. Cette variété est adaptée à l'altitude (914m).

Synonyme génétique: Poire Blèque; Channe; Bratbirne von Versoix.

Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch


www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 09.2022



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille	petite
Poids (min)	57 [g]
Poids (max)	111 [g]
Hauteur (min)	48 [mm]
Hauteur (max)	63 [mm]
Diamètre (min)	47 [mm]
Diamètre (max)	61 [mm]
Forme	sphérique (globuleuse)
Pierrosité	moyenne

Les couleurs

de fond	jaune vert
de recouvrement importance	faible jusqu'à 1/4 du fruit
de recouvrement répartition	lavée (délavée estompée)
de recouvrement couleur	orange

Les Roussissures

Position	autour du pédoncule
Intensité	forte jusqu'à 3/4

Les lenticelles

Ponctuation	ponctuées
Taille	moyennes

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	moyenne à élevée
Acidité	moyenne à élevée
Astringence	faible
Fermeté de la chair	tendre
Jutosité	juteuse
Texture de la chair	pâteuse
Épaisseur de la peau	moyenne
Nature de la saveur	aromatique
Équilibre acide-sucre	équilibrée
Appréciation générale	n.é.

Description de l'arbre

Port de l'arbre	érigé à étalé
Vigueur	moyenne
Ramification	faible
Densité des brindilles	forte
Floraison relative	précoce à moyenne
Charge	n.é.
Maturité relative	précoce à moyenne

Remarques :**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Courte, quelques semaines après récolte.

Utilisations traditionnelles & conseils :**Phénologie**

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation (cave naturelle)	

