

La variété en bref

Historique : Ce patronyme apparaît en 1375 dans cette région

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de petite taille. Cette poire possède une saveur aromatique et équilibrée. Des arômes de coing et d'épices sont perceptibles. Nous la conseillons particulièrement pour son jus mais également pour la cuisson et la transformation. Cette variété montre une bonne résistance aux maladies.

Synonyme génétique: Buchsibire; Gelbmöstler; Gelsüsslerbirne; Grünbirne; Herteigler; Kugelförmige Mostbirne.

Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch


www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Fiche Variétale
Poire Collet
Baulmes (VD)

N° d'inventaire : R13000079
 N° PLCODE : 14-003-132
 N° PUIACC : A0000024100
 N° famille génétique : 118

Description du fruit

Les dimensions

Taille	petite
Poids (min)	62 [g]
Poids (max)	117 [g]
Hauteur (min)	35 [mm]
Hauteur (max)	79 [mm]
Diamètre (min)	47 [mm]
Diamètre (max)	61 [mm]
Forme	sphérique (globuleuse)
Pierrosité	moyenne

Les couleurs

de fond	jaune
de recouvrement importance	très faible
de recouvrement répartition	mouchetée
de recouvrement couleur	rouge

Les Roussissures

Position	sur tout le fruit
Intensité	faible jusqu'à 1/4

Les lenticelles

Ponctuation	ponctuées
Taille	petites

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	moyenne à élevée
Intensité de l'arôme	moyenne à élevée
Persistance du goût	moyenne à longue
Sucré	moyenne
Acidité	faible à moyenne
Astringence	élevée à très élevée
Fermeté de la chair	moyenne
Jutosité	juteuse
Texture de la chair	farineuse
Épaisseur de la peau	moyenne à épaisse
Nature de la saveur	aromatique
Équilibre acide-sucre	équilibrée
Appréciation générale	faible à moyenne

Description de l'arbre

Port de l'arbre	érigé à étalé
Vigueur	moyenne
Ramification	faible à moyenne
Densité des brindilles	faible à moyenne
Floraison relative	précoce
Charge	moyenne
Maturité relative	moyenne à tardive

Remarques :

Relativement résistant à la tavelure (feuille et fruit). Peu sensible à la rouille grillagée sur feuille, relativement résistant à la rouille grillagée sur fruit. Peu sensible au pseudomonas

Conservation et conseils d'utilisation






Conservation :

Consommation ou transformation dès la récolte. Conservation jusqu'à mi-octobre (cave naturelle)

Utilisations traditionnelles & conseils :

Le poirée confectionnée à l'aide de ce fruit est de première qualité. Nous la conseillons également pour la cuisson et la transformation

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation (cave naturelle)	

