


## La variété en bref

**Historique :** Cette variété originaire du centre de la France est décrite pour la première fois en 1690 sous le nom de Bergamote Crésane. Elle a été retrouvée à Fresens sous celui de Crasane.

**Critères discriminants :** Cette variété présente un fruit de moyenne à grosse taille. Cette poire possède une saveur peu aromatique et équilibrée. Sa chair est croquante, plutôt juteuse et assez ferme. Nous la conseillons comme fruit de table.

**Synonyme génétique:** Poire Bergamotte; de Zir; Flons Dechantsbirne.



## Légende :

n.é. = non évalué

## Pour en savoir plus :

[www.pgrel.admin.ch](http://www.pgrel.admin.ch)

[www.retropomme.ch](http://www.retropomme.ch)

## Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Poire Crasane, Fresens

R13000096, ACL 0049-50, 12.11.2010

Dimension de la caissette : 30x40cm



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE  
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme  
Pour la sauvegarde du patrimoine  
fruitier de Suisse Romande

**Description du fruit***Les dimensions*

Taille	moyenne à grosse
Poids (min)	57 [g]
Poids (max)	227 [g]
Hauteur (min)	47 [mm]
Hauteur (max)	77 [mm]
Diamètre (min)	48 [mm]
Diamètre (max)	76 [mm]
Forme	sphérique (globuleuse)
Pierrosité	moyenne

*Les couleurs*

de fond	vert
de recouvrement importance	moyenne jusqu'à 1/2 du fruit
de recouvrement répartition	lavée (délavée estompée)
de recouvrement couleur	orange

*Les Roussissures*

Position	autour du pédoncule et de l'oeil
Intensité	forte jusqu'à 3/4

*Les lenticelles*

Ponctuation	ponctuées
Taille	moyennes

**Description Organoleptique**

Intensité de l'odeur	élevée
Intensité de l'arôme	moyenne
Persistance du goût	courte
Sucré	moyenne
Acidité	faible à moyenne
Astringence	très faible
Fermeté de la chair	moyenne
Jutosité	juteuse
Texture de la chair	croquante
Épaisseur de la peau	épaisse
Nature de la saveur	peu aromatique
Équilibre acide-sucre	équilibrée
Appréciation générale	moyenne

**Description de l'arbre**

Port de l'arbre	érigé à étalé
Vigueur	moyenne
Ramification	moyenne
Densité des brindilles	moyenne à forte
Floraison relative	précoce à moyenne
Charge	moyenne
Maturité relative	tardive

**Remarques :**

Mise à fruit tardive. Relativement résistant à la tavelure (feuille et fruit). Peu sensible à la rouille grillagée sur feuille. Relativement sensible à la rouille grillagée sur fruit. Floraison faible.

**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Jusqu'en février en cave naturelle.

**Utilisations traditionnelles & conseils :**

Nous la conseillons comme fruit de table

**Phénologie**

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation (cave naturelle)	

