

## La variété en bref

**Historique :** Cette variété est particulière au Val-de-Ruz (Cernier, Fenin, Saules...). On la plantait souvent au bord des routes. Son nom est un diminutif de "cuve" soit queue

**Critères discriminants :** Cette variété présente un fruit de petite taille. Cette poire possède une saveur peu aromatique et légèrement douce. Cette poire est principalement utilisée pour la Coeugnarde et le vin-cuit. Cette variété montre une relative bonne résistance aux maladies. Cette variété est adaptée à l'altitude (823m).

**Synonyme génétique:** Unique.

## Légende :

n.é. = non évalué

## Pour en savoir plus :

[www.pgrrel.admin.ch](http://www.pgrrel.admin.ch)


[www.retropomme.ch](http://www.retropomme.ch)

## Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 09.2022



Dimension de la caisse : 30x40cm



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE  
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme  
Pour la sauvegarde du patrimoine  
fruitier de Suisse Romande

**Description du fruit***Les dimensions*

Taille	petite
Poids (min)	35 [g]
Poids (max)	75 [g]
Hauteur (min)	33 [mm]
Hauteur (max)	49 [mm]
Diamètre (min)	42 [mm]
Diamètre (max)	54 [mm]
Forme	ovoïde
Pierrosité	forte

*Les couleurs*

de fond	jaune vert
de recouvrement importance	faible à moyenne
de recouvrement répartition	lavée (délavée estompée)
de recouvrement couleur	rouge-brun

*Les Roussissures*

Position	sur tout le fruit
Intensité	faible à moyenne

*Les lenticelles*

Ponctuation	moyennement ponctuées
Taille	petites

**Description Organoleptique**

Intensité de l'odeur	faible à moyenne
Intensité de l'arôme	faible à moyenne
Persistance du goût	courte à moyenne
Sucré	faible à moyenne
Acidité	très faible
Astringence	manquant
Fermeté de la chair	moyenne à ferme
Jutosité	sèche à très sèche
Texture de la chair	friable
Épaisseur de la peau	moyenne à épaisse
Nature de la saveur	peu aromatique
Équilibre acide-sucre	légèrement douce
Appréciation générale	mauvaise

**Description de l'arbre**

Port de l'arbre	érigé
Vigueur	forte
Ramification	moyenne à forte
Densité des brindilles	forte
Floraison relative	n.é.
Charge	importante
Maturité relative	précoce à moyenne

**Remarques :**

Relativement résistant à la tavelure (feuille et fruit). Peu sensible à la rouille grillagée sur feuille, relativement résistant à la rouille grillagée sur fruit. Relativement résistant au pseudomonas. Floraison importante et homogène.

**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Consommation ou transformation dès la récolte.  
Conservation jusqu'à mi-septembre (cave naturelle)

**Utilisations traditionnelles & conseils :**

Cette poire est principalement utilisée pour la Coeugnarde et le vin-cuit.

**Phénologie**

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation (cave naturelle)	

