

Fiche Variétale

Poire Débaz

Semsaes : They (FR) - CHE

N° d'inventaire : R13003003

N° PLCODE : 14-003-158

N° PUIACC : A0000024123

N° famille génétique : 616

La variété en bref

Historique :

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de petite à moyenne taille. Cette poire possède une saveur peu aromatique et légèrement acide. Cette variété est adaptée à l'altitude (867m).

Synonyme génétique: Unique.

Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch


www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 09.2022



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille	petite à moyenne
Poids (min)	62 [g]
Poids (max)	123 [g]
Hauteur (min)	41 [mm]
Hauteur (max)	59 [mm]
Diamètre (min)	51 [mm]
Diamètre (max)	65 [mm]
Forme	sphérique aplatie
Pierrosité	faible

Les couleurs

de fond	vert
de recouvrement importance	faible à moyenne
de recouvrement répartition	mouchetée
de recouvrement couleur	rouge

Les Roussissures

Position	autour de l'oeil
Intensité	moyenne à forte

Les lenticelles

Ponctuation	ponctuées
Taille	petites

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	faible à moyenne
Acidité	faible à moyenne
Astringence	moyenne à élevée
Fermeté de la chair	moyenne à ferme
Jutosité	moyenne
Texture de la chair	croquante
Épaisseur de la peau	fine à moyenne
Nature de la saveur	peu aromatique
Équilibre acide-sucre	légèrement acide
Appréciation générale	n.é.






Description de l'arbre

Port de l'arbre	étalé
Vigueur	faible
Ramification	faible
Densité des brindilles	faible à moyenne
Floraison relative	précoce
Charge	moyenne
Maturité relative	tardive

Remarques :**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Courte, quelques semaines après récolte.

Utilisations traditionnelles & conseils :**Phénologie**

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation (cave naturelle)	

