

La variété en bref

Historique :

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de moyenne taille. Cette poire possède une saveur aromatique et douce. Sa chaire étant farineuse et peu juteuse nous la conseillons pour la cuisson ou la transformation.

Synonyme génétique: Blanc (Villars-le-Grand); Blanc (Gimel); Blanc (Chavannes-le-Veyron); Blanc (puidoux); Gris (Rossens); Gris (Billens-Henens); Teigbirne.

Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch


www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par Corbaz, R. (Ass. Arboretum d'Aubonne)

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Dimension de la caisse : 30x40cm



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille	moyenne
Poids (min)	81 [g]
Poids (max)	199 [g]
Hauteur (min)	50 [mm]
Hauteur (max)	74 [mm]
Diamètre (min)	52 [mm]
Diamètre (max)	75 [mm]
Forme	turbinée
Pierrosité	moyenne à forte

Les couleurs

de fond	jaune vert
de recouvrement importance	faible jusqu'à 1/4 du fruit
de recouvrement répartition	lavée (délavée estompée)
de recouvrement couleur	orange

Les Roussissures

Position	autour du pédoncule et de l'oeil
Intensité	faible à moyenne

Les lenticelles

Ponctuation	moyennement ponctuées
Taille	grandes

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	moyenne à élevée
Acidité	très faible
Astringence	très faible
Fermeté de la chair	ferme
Jutosité	sèche à moyenne
Texture de la chair	farineuse
Épaisseur de la peau	moyenne à épaisse
Nature de la saveur	aromatique
Équilibre acide-sucre	douce
Appréciation générale	n.é.






Description de l'arbre

Port de l'arbre	étalé
Vigueur	forte à très forte
Ramification	moyenne
Densité des brindilles	moyenne à forte
Floraison relative	moyenne
Charge	importante
Maturité relative	moyenne à tardive

Remarques :**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :****Utilisations traditionnelles & conseils :**

Fruit pour la cuisson et la transformation.

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation (cave naturelle)	

