


La variété en bref

Historique : Appelée Divertet à Bonvillars, cette variété est naguère et plus justement nommée Guivertet à Fontaines-sur-Grandson.

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de petite à moyenne taille. Cette poire possède une saveur aromatique et équilibrée. Elle était pressurée ou écrasée pour épaissir la cougnarde. Cette variété montre une relative bonne résistance aux maladies.

Synonyme génétique: Unique.



Poire Guivertet, Bonvillars

R13000125, NEU T048, 29.10.2013

Dimension de la caisse : 30x40cm

Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch

www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 09.2022



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille	petite à moyenne
Poids (min)	63 [g]
Poids (max)	146 [g]
Hauteur (min)	38 [mm]
Hauteur (max)	53 [mm]
Diamètre (min)	46 [mm]
Diamètre (max)	69 [mm]
Forme	sphérique aplatie
Pierrosité	moyenne

Les couleurs

de fond	vert
de recouvrement importance	absente
de recouvrement répartition	
de recouvrement couleur	

Les Roussissures

Position	autour du pédoncule
Intensité	moyenne à forte

Les lenticelles

Ponctuation	moyennement ponctuées
Taille	petites

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	faible
Acidité	n.é.
Astringence	n.é.
Fermeté de la chair	moyenne
Jutosité	juteuse à très juteuse
Texture de la chair	croquante
Épaisseur de la peau	fine
Nature de la saveur	aromatique
Équilibre acide-sucre	équilibrée
Appréciation générale	n.é.

Description de l'arbre

Port de l'arbre	érigé à étalé
Vigueur	moyenne à forte
Ramification	moyenne
Densité des brindilles	moyenne
Floraison relative	n.é.
Charge	moyenne
Maturité relative	très tardive

Remarques :

Relativement résistant à la tavelure (feuille et fruit).
Relativement résistant à la rouille grillagée (feuille et fruit).

Conservation et conseils d'utilisation**Conservation :**

Jusqu'à début janvier en cave naturelle.

Utilisations traditionnelles & conseils :

Elle était pressurée ou écrasée pour épaissir la cougnarde.

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation (cave naturelle)	

