

Poire d' Orient

Chavannes-le-Veyron (VD) - CHE

N° d'inventaire : R13000152

N° PLCODE : 14-003-441

N° PUIACC : A0000024482

N° famille génétique : 99

La variété en bref

Historique : Elle porte le nom de Poire d'Orient à Chavannes-le-Veyron, Poire-Bouteille à Aubonne et Onnens, Poire-Tonneau à Vufflens-le-Château et Poire-Panfard à Saint-Livre.

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de moyenne à grosse taille. Cette poire possède une saveur aromatique et très douce. Elle convient à tous les usages (table, cuisson, séchage, jus, distillation ou raisinée). Cette variété montre une relative bonne résistance aux maladies.

Synonyme génétique: Poire Bouteille; Rougin; Kiefferbirne.

Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch


www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille	moyenne à grosse
Poids (min)	116 [g]
Poids (max)	246 [g]
Hauteur (min)	72 [mm]
Hauteur (max)	92 [mm]
Diamètre (min)	56 [mm]
Diamètre (max)	85 [mm]
Forme	turbinée
Pierrosité	faible

Les couleurs

de fond	jaune vert
de recouvrement importance	moyenne jusqu'à 1/2 du fruit
de recouvrement répartition	lavée (délavée estompée)
de recouvrement couleur	rouge

Les Roussissures

Position	sur tout le fruit
Intensité	très faible

Les lenticelles

Ponctuation	ponctuées
Taille	grandes

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	élevée
Intensité de l'arôme	moyenne à élevée
Persistance du goût	longue
Sucré	moyenne à élevée
Acidité	faible
Astringence	faible
Fermeté de la chair	ferme
Jutosité	moyenne
Texture de la chair	croquante
Épaisseur de la peau	épaisse
Nature de la saveur	aromatique
Équilibre acide-sucre	très douce
Appréciation générale	assez bonne

Description de l'arbre

Port de l'arbre	érigé à étalé
Vigueur	moyenne à forte
Ramification	faible à moyenne
Densité des brindilles	moyenne
Floraison relative	précoce à moyenne
Charge	importante
Maturité relative	moyenne

Remarques :

Relativement résistant à la tavelure (feuille et fruit).
Relativement résistant à la rouille grillagée (feuille et fruit). Peu sensible au pseudomonas. Variété triploïde, mauvais pollen.






Conservation et conseils d'utilisation**Conservation :**

Consommation ou transformation dès mi-octobre
Conservation jusqu'à début novembre (cave naturelle)

Utilisations traditionnelles & conseils :

Ce fruit de table convient pour tous les usages

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation (cave naturelle)	

