


La variété en bref

Historique : Il est question de poiriers de *Pliäs* ou *Plias* en 1866 et 1873.

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de petite à moyenne taille. Cette poire possède une saveur peu aromatique et légèrement acide. Des arômes de moût de pomme et de litchis sont perceptibles. Elle convient pour la cuisson ou le séchage. Cette variété montre une bonne résistance aux maladies. Elle est adaptée à l'altitude (956m).

Synonyme génétique: Unique.



Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch

www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Poire Piasse, Ayent

R13000158, NEU P036, 17.12.2009

Dimension de la caisse : 30x40cm



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme

Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille	petite à moyenne
Poids (min)	67 [g]
Poids (max)	151 [g]
Hauteur (min)	45 [mm]
Hauteur (max)	60 [mm]
Diamètre (min)	54 [mm]
Diamètre (max)	78 [mm]
Forme	sphérique aplatie
Pierrosité	nulle

Les couleurs

de fond	vert
de recouvrement importance	moyenne jusqu'à 1/2 du fruit
de recouvrement répartition	lavée (délavée estompée)
de recouvrement couleur	rouge

Les Roussissures

Position	autour du pédoncule et de l'oeil
Intensité	faible jusqu'à 1/4

Les lenticelles

Ponctuation	ponctuées
Taille	grandes

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	élevée
Intensité de l'arôme	moyenne
Persistance du goût	moyenne
Sucré	moyenne
Acidité	faible à moyenne
Astringence	très faible
Fermeté de la chair	ferme
Jutosité	juteuse
Texture de la chair	croquante
Épaisseur de la peau	moyenne
Nature de la saveur	peu aromatique
Équilibre acide-sucre	légèrement acide
Appréciation générale	moyenne à bonne

Description de l'arbre

Port de l'arbre	érigé à étalé
Vigueur	moyenne à forte
Ramification	faible à moyenne
Densité des brindilles	faible à moyenne
Floraison relative	précoce à moyenne
Charge	n.é.
Maturité relative	moyenne à tardive

Remarques :

Relativement résistant à la tavelure (feuille et fruit). Peu sensible à la rouille grillagée sur feuille, relativement résistant à la rouille grillagée sur fruit.

Conservation et conseils d'utilisation**Conservation :**

Assez courte, un mois après récolte.

Utilisations traditionnelles & conseils :

Traditionnellement séchée, on la conseille cuite (p. ex : choucroute) ou en conserve

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation (cave naturelle)	

