


La variété en bref

Historique : Le mot " adze " ou " age " signifie haie en patois et dans l'ancien langage

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de moyenne taille. Cette poire possède une saveur parfumée et douce. Sa chaire beurrée et fondante en fait un bon fruit de table. Elle se conserve moyennement longtemps en cave naturelle (fin décembre). Cette variété montre une relative bonne résistance aux maladies.

Synonyme génétique: Poire d'Adge.



Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch

www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Dimension de la caisse : 30x40cm



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille	moyenne
Poids (min)	38 [g]
Poids (max)	190 [g]
Hauteur (min)	52 [mm]
Hauteur (max)	85 [mm]
Diamètre (min)	43 [mm]
Diamètre (max)	67 [mm]
Forme	calabassiforme étroite
Pierrosité	moyenne

Les couleurs

de fond	jaune vert
de recouvrement importance	faible à moyenne
de recouvrement répartition	lavée (délavée estompée)
de recouvrement couleur	rouge

Les Roussissures

Position	sur tout le fruit
Intensité	forte jusqu'à 3/4

Les lenticelles

Ponctuation	ponctuées
Taille	petites à moyennes

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	moyenne à élevée
Intensité de l'arôme	moyenne à élevée
Persistance du goût	moyenne à longue
Sucré	élevée
Acidité	faible
Astringence	manquant
Fermeté de la chair	tendre à moyenne
Jutosité	juteuse
Texture de la chair	beurré
Épaisseur de la peau	moyenne
Nature de la saveur	parfumée
Équilibre acide-sucre	douce
Appréciation générale	bien appréciée

Description de l'arbre

Port de l'arbre	étalé à retombant
Vigueur	moyenne
Ramification	moyenne
Densité des brindilles	moyenne
Floraison relative	très précoce à précoce
Charge	importante
Maturité relative	tardive

Remarques :

Relativement résistant à la tavelure (feuille et fruit). Peu sensible à la rouille grillagée sur feuille, relativement résistant à la rouille grillagée sur fruit. Peu sensible au pseudomonas.

Conservation et conseils d'utilisation**Conservation :**

Consommation ou transformation dès la récolte.
Conservation jusqu'à fin décembre (cave naturelle)

Utilisations traditionnelles & conseils :

Traditionnellement, ce fruit était pressuré pour la coignarde, vin-cuit ou raisinée. Nous la conseillons aussi comme poire de table

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation (cave naturelle)	

