

La variété en bref

Historique :


Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de petite taille. Cette poire possède une saveur aromatique et douce. Traditionnellement cuite pour accompagner de la viande et du chou. Elle peut également être conseillée comme fruit de table.

Synonyme génétique: Poire Gode; Recordon; Martignerin; Verdand; Verdet.



Poire Cavouirou (Savièse: Roumaz)

Appréciation générale: 7.5



Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch

www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 09.2022



Dimension de la caisse : 30x40cm



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme

Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille	petite
Poids (min)	30 [g]
Poids (max)	102 [g]
Hauteur (min)	38 [mm]
Hauteur (max)	63 [mm]
Diamètre (min)	37 [mm]
Diamètre (max)	57 [mm]
Forme	sphérique (globuleuse)
Pierrosité	très faible à faible

Les couleurs

de fond	vert
de recouvrement importance	faible jusqu'à 1/4 du fruit
de recouvrement répartition	striée
de recouvrement couleur	rosée

Les Roussissures

Position	autour de l'oeil
Intensité	très faible

Les lenticelles

Ponctuation	peu ponctuées
Taille	petites

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	moyenne
Intensité de l'arôme	élevée à très élevée
Persistance du goût	longue
Sucré	élevée à très élevée
Acidité	faible à moyenne
Astringence	manquant
Fermeté de la chair	moyenne
Jutosité	juteuse à très juteuse
Texture de la chair	friable
Épaisseur de la peau	moyenne à épaisse
Nature de la saveur	aromatique
Équilibre acide-sucre	douce
Appréciation générale	assez bonne

Description de l'arbre

Port de l'arbre	étalé
Vigueur	faible à moyenne
Ramification	moyenne
Densité des brindilles	moyenne
Floraison relative	très précoce à précoce
Charge	petite
Maturité relative	moyenne

Remarques :**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :****Utilisations traditionnelles & conseils :**

Traditionnellement cuite pour accompagner de la viande et du chou. Elle peut également être conseillée comme fruit de table

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation (cave naturelle)	

