

La variété en bref

Historique : Dans les hameaux d'Ayent, on dit Abériel ou Aberière (Botyre), Aberié (St-Romain), Aberié (Blignoud), ainsi que Abériette en 1901

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de petite à moyenne taille. Cette poire possède une saveur parfumée et douce. Des arômes de fruits exotiques sont perceptibles. Traditionnellement, ce fruit était séché et utilisé pour fourrager les cochons. Nous la conseillons pour la transformation et pour le séchage. Cette variété est adaptée à l'altitude (1129m).

Synonyme génétique: Aberiet (Chermignon); Aberiet (Ayent).

Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgr.admin.ch


www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme

Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille	petite à moyenne
Poids (min)	35 [g]
Poids (max)	94 [g]
Hauteur (min)	46 [mm]
Hauteur (max)	64 [mm]
Diamètre (min)	38 [mm]
Diamètre (max)	54 [mm]
Forme	ovoïde
Pierrosité	faible

Les couleurs

de fond	jaune vert
de recouvrement importance	absente
de recouvrement répartition	
de recouvrement couleur	

Les Roussissures

Position	autour du pédoncule et sur les joues
Intensité	faible jusqu'à 1/4

Les lenticelles

Ponctuation	ponctuées
Taille	moyennes

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	moyenne
Intensité de l'arôme	élevée
Persistance du goût	moyenne
Sucré	moyenne
Acidité	faible à moyenne
Astringence	faible
Fermeté de la chair	tendre à moyenne
Jutosité	sèche à moyenne
Texture de la chair	beurré
Épaisseur de la peau	fine à moyenne
Nature de la saveur	parfumée
Équilibre acide-sucre	douce
Appréciation générale	mauvaise

Description de l'arbre

Port de l'arbre	érigé à étalé
Vigueur	moyenne
Ramification	faible à moyenne
Densité des brindilles	n.é.
Floraison relative	précoce à moyenne
Charge	importante
Maturité relative	précoce à moyenne

Remarques :

Moyennement sensible à la tavelure sur feuille, sensible à la tavelure sur fruit. Relativement résistant à la rouille grillagée (feuille et fruit)






Conservation et conseils d'utilisation**Conservation :**

Courte jusqu'à fin octobre.

Utilisations traditionnelles & conseils :

Traditionnellement ce fruit était séché et utilisé pour fourrager les cochons. Nous la conseillons pour la transformation et pour le séchage

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation (cave naturelle)	

