

Fiche Variétale

# Poire Roussette

Vallon de l'Aubonne (VD) - CHE


N° d'inventaire : A1304036  
N° PLCODE : 14-003-2526  
N° PUIACC : A0000024747  
N° famille génétique : 580

## La variété en bref

### Historique :

**Critères discriminants :** Cette variété présente un fruit de petite à moyenne taille. Cette poire possède une saveur aromatique et équilibrée.

**Synonyme génétique:** Unique.



### Légende :

n.é. = non évalué

### Pour en savoir plus :

[www.pgrel.admin.ch](http://www.pgrel.admin.ch)  
[www.retropomme.ch](http://www.retropomme.ch)

### Bibliographie

Inventaire réalisé par Corbaz, R. (Ass. Arboretum d'Aubonne)

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 09.2022



Dimension de la caisse : 30x40cm



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE  
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme  
Pour la sauvegarde du patrimoine  
fruitier de Suisse Romande

**Description du fruit***Les dimensions*

Taille	petite à moyenne
Poids (min)	50 [g]
Poids (max)	156 [g]
Hauteur (min)	50 [mm]
Hauteur (max)	81 [mm]
Diamètre (min)	51 [mm]
Diamètre (max)	74 [mm]
Forme	turbinée aplatie
Pierrosité	moyenne

*Les couleurs*

de fond	jaune vert
de recouvrement importance	moyenne jusqu'à 1/2 du fruit
de recouvrement répartition	lavée (délavée estompée)
de recouvrement couleur	rouge violacé

*Les Roussissures*

Position	autour de l'oeil et sur les joues
Intensité	faible à moyenne

*Les lenticelles*

Ponctuation	ponctuées
Taille	moyennes

**Description Organoleptique**

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	moyenne
Acidité	faible
Astringence	faible à moyenne
Fermeté de la chair	ferme
Jutosité	moyenne à juteuse
Texture de la chair	friable
Épaisseur de la peau	moyenne
Nature de la saveur	aromatique
Équilibre acide-sucre	équilibrée
Appréciation générale	n.é.

**Description de l'arbre**

Port de l'arbre	étalé
Vigueur	forte à très forte
Ramification	forte
Densité des brindilles	forte
Floraison relative	moyenne à tardive
Charge	importante
Maturité relative	moyenne

**Remarques :****Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :****Utilisations traditionnelles & conseils :****Phénologie**

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation (cave naturelle)	

