


La variété en bref

Historique :

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de petite à moyenne taille. Cette poire possède une saveur peu aromatique et douce. Cette poire est destinée à la cuisson.

Synonyme génétique: Rundholzer; Viznauer Holzbirne.



Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch

www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par Fructus au cours du PAN 01-8

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 09.2022



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme

Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille	petite à moyenne
Poids (min)	35 [g]
Poids (max)	141 [g]
Hauteur (min)	43 [mm]
Hauteur (max)	63 [mm]
Diamètre (min)	41 [mm]
Diamètre (max)	68 [mm]
Forme	sphérique (globuleuse)
Pierrosité	moyenne

Les couleurs

de fond	vert
de recouvrement importance	forte à très forte
de recouvrement répartition	plage continu
de recouvrement couleur	rouge-brun

Les Roussissures

Position	sur tout le fruit
Intensité	moyenne à forte

Les lenticelles

Ponctuation	moyennement ponctuées
Taille	petites

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	
Sucré	moyenne à élevée
Acidité	très faible
Astringence	faible
Fermeté de la chair	très ferme
Jutosité	moyenne
Texture de la chair	croquante
Épaisseur de la peau	épaisse
Nature de la saveur	peu aromatique
Équilibre acide-sucre	douce
Appréciation générale	






Description de l'arbre

Port de l'arbre	érigé
Vigueur	moyenne à forte
Ramification	moyenne à forte
Densité des brindilles	forte
Floraison relative	moyenne à tardive
Charge	n.é.
Maturité relative	tardive à très tardive

Remarques :**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :****Utilisations traditionnelles & conseils :**

Fruit à cuisson

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation (cave naturelle)	

