

Fiche Variétale

Poire Beurrée grise

Pomy (VD) - CHE

N° d'inventaire : 1039889
N° PLCODE : 14-003-1565
N° PUIACC : A0000025024
N° famille génétique : 129

La variété en bref

Historique :

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de moyenne à grosse taille. Cette poire possède une saveur aromatique et très douce. Sa chair fine, beurrée et bien juteuse en fait un très bon fruit de table. Elle peut aussi être utilisée pour la confection de cidre.

Synonyme génétique: Doppelte Philippsbirne; Pero Caninica.

Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :


www.pgrel.admin.ch
www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par Fructus au cours du PAN 01-8

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille	moyenne à grosse
Poids (min)	124 [g]
Poids (max)	431 [g]
Hauteur (min)	59 [mm]
Hauteur (max)	97 [mm]
Diamètre (min)	60 [mm]
Diamètre (max)	95 [mm]
Forme	turbinée aplatie
Pierrosité	faible

Les couleurs

de fond	vert blanchâtre
de recouvrement importance	très faible
de recouvrement répartition	lavée (délavée estompée)
de recouvrement couleur	rosée

Les Roussissures

Position	sur tout le fruit
Intensité	faible jusqu'à 1/4

Les lenticelles

Ponctuation	ponctuées
Taille	moyennes

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	élevée à très élevée
Acidité	faible
Astringence	très faible
Fermeté de la chair	très tendre
Jutosité	juteuse à très juteuse
Texture de la chair	beurré
Épaisseur de la peau	moyenne
Nature de la saveur	aromatique
Équilibre acide-sucre	très douce
Appréciation générale	n.é.

Description de l'arbre

Port de l'arbre	retombant à pleureur
Vigueur	moyenne à forte
Ramification	moyenne
Densité des brindilles	moyenne
Floraison relative	moyenne à tardive
Charge	moyenne
Maturité relative	précoce à moyenne






Remarques :**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Courte, quelques semaines après récolte.

Utilisations traditionnelles & conseils :

Excellent fruit pour le jus. Peut aussi être transformé pour le cidre. Nous la conseillons aussi comme fruit de table

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation (cave naturelle)	

