

Fiche Variétale

Poire San-Règle

Vallon (FR) - CHE

N° d'inventaire : R13000188

N° PLCODE : 14-003-548

N° PUIACC : A0000025331


N° famille génétique : 146

La variété en bref

Historique : Cette variété très ancienne est décrite une première fois vers 1750 dans la région de Saint-Blaise.

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de petite taille. Cette poire possède une saveur aromatique et douce. C'est une poire destinée à la cuisson. Cette variété montre une bonne résistance aux maladies.

Synonyme génétique: Poire Surègle.



Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch

www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2022



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille	petite
Poids (min)	28 [g]
Poids (max)	190 [g]
Hauteur (min)	35 [mm]
Hauteur (max)	70 [mm]
Diamètre (min)	37 [mm]
Diamètre (max)	64 [mm]
Forme	calabassiforme large
Pierrosité	forte

Les couleurs

de fond	vert blanchâtre
de recouvrement importance	moyenne jusqu'à 1/2 du fruit
de recouvrement répartition	lavée (délavée estompée)
de recouvrement couleur	rouge

Les Roussissures

Position	autour du pédoncule et de l'oeil
Intensité	très faible

Les lenticelles

Ponctuation	moyennement ponctuées
Taille	petites

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	moyenne à élevée
Acidité	très faible
Astringence	faible
Fermeté de la chair	ferme
Jutosité	moyenne
Texture de la chair	friable
Épaisseur de la peau	moyenne
Nature de la saveur	aromatique
Équilibre acide-sucre	douce
Appréciation générale	n.é.

Description de l'arbre

Port de l'arbre	érigé à étalé
Vigueur	forte
Ramification	moyenne
Densité des brindilles	faible
Floraison relative	tardive à très tardive
Charge	moyenne
Maturité relative	très tardive

Remarques :

Relativement résistant à la tavelure (feuille et fruit). Peu sensible à la rouille grillagée sur feuille, relativement résistant à la rouille grillagée sur fruit. Peu sensible au pseudomonas. Variété diploïde, bon pollen, fertilité 92%. Fructification en mouchets, bien répartis sur l'ensemble de la couronne

Conservation et conseils d'utilisation**Conservation :**

Consommation ou transformation dès fin janvier.
Conservation jusqu'à mi-mars (cave naturelle)

Utilisations traditionnelles & conseils :

Ce fruit est traditionnellement cuit soit en compote soit mélangé à de la viande.

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation (cave naturelle)	

