

La variété en bref

Historique : On dit Voidjà ou Voidà à Damvant. L'appellation Voidjà, de genre féminin, signifie verdâtre. Elle a cours également à Glovelier, Pleujouse (Poire de Voidjà) et aux Pommerats.

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de petite taille. Cette poire possède une saveur peu aromatique et légèrement douce. Dans certaine région jurasienne, ce fruit se substituait autrefois au pain. Cette variété montre une bonne résistance aux maladies.

Synonyme génétique: Unique.

Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch


www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 09.2022



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille	petite
Poids (min)	25 [g]
Poids (max)	54 [g]
Hauteur (min)	30 [mm]
Hauteur (max)	38 [mm]
Diamètre (min)	38 [mm]
Diamètre (max)	49 [mm]
Forme	sphérique aplatie
Pierrosité	faible

Les couleurs

de fond	jaune vert
de recouvrement importance	absente
de recouvrement répartition	
de recouvrement couleur	

Les Roussissures

Position	autour de l'oeil et sur les joues
Intensité	faible jusqu'à 1/4

Les lenticelles

Ponctuation	moyennement ponctuées
Taille	moyennes

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	moyenne
Acidité	faible
Astringence	faible
Fermeté de la chair	moyenne à ferme
Jutosité	moyenne à juteuse
Texture de la chair	spongieuse
Épaisseur de la peau	fine à moyenne
Nature de la saveur	peu aromatique
Équilibre acide-sucre	légèrement douce
Appréciation générale	n.é.

Description de l'arbre

Port de l'arbre	érigé
Vigueur	faible à moyenne
Ramification	faible
Densité des brindilles	faible
Floraison relative	précoce à moyenne
Charge	importante
Maturité relative	précoce

Remarques :

Relativement résistant à la tavelure sur feuille, peu sensible à la tavelure sur fruit. Moyennement sensible à la rouille grillagée sur feuille, peu sensible à la rouille grillagée sur fruit. Moyennement sensible au pseudomonas.






Conservation et conseils d'utilisation**Conservation :**

Consommation ou transformation dès la récolte
Conservation jusqu'à mi-octobre (cave naturelle)

Utilisations traditionnelles & conseils :

Dans certaine région jurasienne, ce fruit se substituait autrefois au pain.

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation (cave naturelle)	

