

Cerise Merise brune

Puidoux (VD) - CHE

N° d'inventaire : R10040451

N° PLCODE : 14-007-389

N° PUIACC : A0000025908


N° famille génétique : 386

La variété en bref

Historique : Cette variété provient de Puidoux. L'appellation était connue également à Cheyres, Cournillens et Villargiroud.

Critères discriminants : Cette variété présente une cerise de moyenne taille à la saveur peu aromatique et acidulée. C'est un fruit de conserve et de distillation.

Synonyme génétique: Griotte (Mannens); Griotte Berger; Griotte de Vilaranon; Schwänberglerkirsche; Griotte Douce.



Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch

www.retopomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 09.2022



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille du fruit	moyenne
Poids de 20 fruits	78 à 141 [g]
Forme	sphérique
Taille du noyau	moyen
Longueur du pédoncule	24 à 41 [mm]

Les couleurs

De la peau	rouge
De la chair	rouge
Du jus	rose

Les détails discriminants

Implantation du pédoncule	moyenne
Saignement	nul
Détachement du noyau	moyen

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	faible
Acidité	élevée
Fermeté de la chair	tendre
Jutosité	moyenne à juteuse
Épaisseur de la peau	fine
Nature de la saveur	peu aromatique
Équilibre acide-sucre	très acide
Appréciation générale	n.é.

Phénologie

 Débouré	 Floraison stade F2	 Cueillette
 Floraison stade F1	 Consommation & conservation	

Avr.


Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.



Variété de référence : Cerise Hudson, PUIACC : A0000026621

Description de l'arbre

Port de l'arbre	érigé
Vigueur	moyenne
Ramification	moyenne à forte
Densité des brindilles	moyenne à forte
Floraison relative	tardive
Charge	n.é.
Maturité relative	précoce à moyenne

Remarques :**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Les cerises sont à consommer ou transformer rapidement.

Utilisations traditionnelles & conseils :