

# Cerise Blanche


*Cormondrèche (NE) - CHE*

## La variété en bref

### Historique :

**Critères discriminants :** Cette variété présente une cerise de taille moyenne à la saveur aromatique et bien équilibrée entre l'acidulé et le sucré. Sa peau plutôt épaisse et sa chaire ferme en fait un fruit robuste.

**Synonyme génétique:** Butterkirsche, Weise Klöpfer, Gelbe Kirsche, Goldchriesi, Traubenkirsche, Weisse Kirsche.



### Légende :

n.é. = non évalué

### Pour en savoir plus :

[www.pgrel.admin.ch](http://www.pgrel.admin.ch)

[www.retropomme.ch](http://www.retropomme.ch)

### Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE  
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme  
Pour la sauvegarde du patrimoine  
fruitier de Suisse Romande

**Description du fruit***Les dimensions*

Taille du fruit	moyenne à grosse
Poids de 20 fruits	92 à 136 [g]
Forme	cordiforme
Taille du noyau	moyen
Longueur du pédoncule	54 [mm]

*Les couleurs*

De la peau	jaune
De la chair	jaune
Du jus	incolore

*Les détails discriminants*

Implantation du pédoncule	moyenne
Saignement	nul
Détachement du noyau	mauvais

**Description Organoleptique**

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	moyenne
Acidité	moyenne
Fermeté de la chair	ferme
Jutosité	moyenne
Épaisseur de la peau	moyenne à épaisse
Nature de la saveur	aromatique
Équilibre acide-sucre	équilibrée
Appréciation générale	n.é.

**Phénologie**

 Débouré	 Floraison stade F2	 Cueillette
 Floraison stade F1	 Consommation & conservation	

Avr.


Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.



Variété de référence : Cerise Hudson, PUIACC : A0000026621

**Description de l'arbre**

Port de l'arbre	étalé
Vigueur	moyenne à forte
Ramification	moyenne
Densité des brindilles	moyenne à forte
Floraison relative	moyenne à tardive
Charge	moyenne à importante
Maturité relative	tardive

**Remarques :****Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Les cerises sont à consommer ou transformer rapidement.

**Utilisations traditionnelles & conseils :**

Fruit de table ou à conserver en sirop.