

Cerise Cassadent

Cheyres : les Granges (FR) - CHE

N° d'inventaire : R10000005

N° PLCODE : 14-007-99

N° PUIACC : A0000026069


N° famille génétique : 87

La variété en bref

Historique : L'appellation Cassadent est, en quelque sorte, un surnom pour désigner les Guindes. Elle signifie « casse-dent », par allusion à la dureté des fruits.

Critères discriminants : Cette variété présente une cerise de taille moyenne à la saveur peu aromatique et équilibrée. Sa chaire très ferme en fait un fruit robuste facile à transporter.

Synonyme génétique: Unique.



Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch

www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille du fruit	moyenne
Poids de 20 fruits	82 à 108 [g]
Forme	cordiforme
Taille du noyau	moyen
Longueur du pédoncule	44 [mm]

Les couleurs

De la peau	rouge claire
De la chair	jaune
Du jus	incolore

Les détails discriminants


Implantation du pédoncule	forte
Saignement	nul
Détachement du noyau	mauvais

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	moyenne
Acidité	faible
Fermeté de la chair	très ferme
Jutosité	moyenne
Épaisseur de la peau	épaisse
Nature de la saveur	peu aromatique
Équilibre acide-sucre	équilibrée
Appréciation générale	n.é.

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F2	 Cueillette
 Floraison stade F1	 Consommation & conservation	



Variété de référence : Cerise Hudson, PUIACC : A0000026621

Description de l'arbre

Port de l'arbre	érigé à étalé
Vigueur	forte
Ramification	moyenne à forte
Densité des brindilles	forte
Floraison relative	précoce à moyenne
Charge	n.é.
Maturité relative	moyenne à tardive

Remarques :**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Les cerises sont à consommer ou transformer rapidement.

Utilisations traditionnelles & conseils :

Fruit de table.