

Cerise Gadeau

Treytorrens-Payerne (VD) - CHE

N° d'inventaire : R10030382

N° PLCODE : 14-007-186

N° PUIACC : A0000026132


N° famille génétique : 8

La variété en bref

Historique : On dit Gadó ou Kadó vers 1880 à Cossonay, Pailly et Penthalaz.

Critères discriminants : Cette variété présente une cerise de taille moyenne à grande. Elle possède une saveur aromatique et équilibrée.


Synonyme génétique: Cassadent; Casse-à-dent, Coeur de pigeon (noir), Empereur, Frühe Braune, Grosses Känsterli, Schwarzwaldkirsche, Speidelfinger, Spiezer Herzkirsche, Streifenkirsche, Hedelfinger Abels späte M.



Cerise Gadeau, Treytorrens-Payerne

R10030382, ACL G007-08, 27.06.2012

Cerise Gadeau (Treytorrens-Payerne)



Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch

www.retopomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 09.2022

Cerise Gadeau, Treytorrens-Payerne

R10030382, ACL G007-08, 24.06.2014

Dimension de la caisse : 20x30cm



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille du fruit	moyenne à grosse
Poids de 20 fruits	101 à 147 [g]
Forme	elliptique
Taille du noyau	moyen
Longueur du pédoncule	40 à 51 [mm]

Les couleurs

De la peau	rouge foncée
De la chair	rouge
Du jus	pourpre

Les détails discriminants

Implantation du pédoncule	
Saignement	faible
Détachement du noyau	mauvais

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	moyenne
Acidité	moyenne
Fermeté de la chair	ferme
Jutosité	moyenne
Épaisseur de la peau	moyenne à épaisse
Nature de la saveur	aromatique
Équilibre acide-sucre	équilibrée
Appréciation générale	n.é.

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F2	 Cueillette
 Floraison stade F1	 Consommation & conservation	

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.



Variété de référence : Cerise Hudson, PUIACC : A0000026621

Description de l'arbre

Port de l'arbre	étalé
Vigueur	moyenne
Ramification	forte
Densité des brindilles	moyenne
Floraison relative	précoce à moyenne
Charge	moyenne à importante
Maturité relative	moyenne

Remarques :**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Les cerises sont à consommer ou transformer rapidement.

Utilisations traditionnelles & conseils :