


La variété en bref

Historique :

Critères discriminants : Cette variété présente une cerise de petite taille à la saveur peu aromatique et acidulée. Le port retombant de l'arbre est typique de cette variété.

Synonyme génétique: Gelbe Weichsel, Griotte tardive, Zahnkirsche.



Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch

www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par Corbaz, R. (Ass. Arboretum d'Aubonne)

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille du fruit	petite
Poids de 20 fruits	75 à 96 [g]
Forme	sphérique aplatie
Taille du noyau	moyen
Longueur du pédoncule	38 [mm]

Les couleurs

De la peau	rouge
De la chair	blanc crème
Du jus	incolore

Les détails discriminants

Implantation du pédoncule	moyenne
Saignement	faible
Détachement du noyau	moyen

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	très faible
Acidité	élevée
Fermeté de la chair	très tendre
Jutosité	juteuse
Épaisseur de la peau	fine à moyenne
Nature de la saveur	peu aromatique
Équilibre acide-sucre	très acide
Appréciation générale	n.é.

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F2	 Cueillette
 Floraison stade F1	 Consommation & conservation	

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.



Variété de référence : Cerise Hudson, PUIACC : A0000026621

Description de l'arbre

Port de l'arbre	pleureur (longues branches)
Vigueur	faible à moyenne
Ramification	moyenne
Densité des brindilles	moyenne à forte
Floraison relative	tardive
Charge	n.é.
Maturité relative	moyenne

Remarques :**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Les cerises sont à consommer ou transformer rapidement.

Utilisations traditionnelles & conseils :

Ce fruit est destiné à la transformation (distillation).