

Cerise Rouge commune

Montalchez : les Prises (NE) - CHE

N° d'inventaire : R10000024

N° PLCODE : 14-007-417

N° PUIACC : A0000026273


N° famille génétique : 197

La variété en bref

Historique : En 1884, « la cerise Rouge commune est particulière au pied du Jura neuchâtelois et vaudois.


Critères discriminants : Cette variété présente une cerise de très petite taille à la saveur aromatique et douce. Traditionnellement, très bon fruit pour le séchage et la distillation mais se laisse dégusté à la main avec plaisir. Cette variété est adaptée à l'altitude (904m).

Synonyme génétique: Unique.




Cerise Rouge commune, Montalchez: Les Prises | R10000024, ACL 1005-06, 25.06.2012

Cerise Rouge Commune (Montalchez)



Attribut	Score (Moyenne)
Sucré	6
Acidité	2
Consistance (fermeté) de la chair	1
Consistance de la peau	1
Jus	1

— Moyenne des dégustations au cours des projets PAN



Cerise Rouge commune, Montalchez: Les Prises | R10000024, ACL 1005-06, 11.06.2014

Dimension de la caisse : 20x30cm

Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch

www.retopomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille du fruit	très petite
Poids de 20 fruits	69 à 70 [g]
Forme	réniforme
Taille du noyau	grand
Longueur du pédoncule	35 à 41 [mm]

Les couleurs

De la peau	rouge claire
De la chair	blanc crème
Du jus	incolore






Les détails discriminants

Implantation du pédoncule	moyenne
Saignement	faible
Détachement du noyau	mauvais

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	moyenne à élevée
Acidité	faible à moyenne
Fermeté de la chair	tendre
Jutosité	moyenne
Épaisseur de la peau	moyenne
Nature de la saveur	aromatique
Équilibre acide-sucre	douce
Appréciation générale	n.é.

Phénologie

 Débouré	 Floraison stade F2	 Cueillette
 Floraison stade F1	 Consommation & conservation	

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.



Variété de référence : Cerise Hudson, PUIACC : A0000026621

Description de l'arbre

Port de l'arbre	érigé
Vigueur	moyenne
Ramification	forte
Densité des brindilles	moyenne
Floraison relative	précoce à moyenne
Charge	importante
Maturité relative	moyenne

Remarques :**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Les cerises sont à consommer ou transformer rapidement.

Utilisations traditionnelles & conseils :

Traditionnellement, très bon fruit pour le séchage et la distillation mais se laisse dégusté à la main avec plaisir.