

Poire Bergamote

Provence (VD) - CHE

N° d'inventaire : R13010376

N° PLCODE : 14-003-2529

N° PUIACC : A0000037136


N° famille génétique : 117

La variété en bref

Historique : Cette poire originaire du centre de la France est décrite pour la première fois en 1690 sous le nom de "Bergamote Crésane".

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de moyenne à grosse taille. Cette poire possède une saveur peu aromatique et douce. C'est un bon fruit de table qui s'apprête bien en conserves.

Synonyme génétique: Poire Crasane; Crassane; de Zir; Flons Dechantsbirne.



Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrrel.admin.ch

www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 09.2022



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille	moyenne à grosse
Poids (min)	123 [g]
Poids (max)	281 [g]
Hauteur (min)	53 [mm]
Hauteur (max)	81 [mm]
Diamètre (min)	61 [mm]
Diamètre (max)	82 [mm]
Forme	ovoïde
Pierrosité	faible

Les couleurs

de fond	vert
de recouvrement importance	faible jusqu'à 1/4 du fruit
de recouvrement répartition	lavée (délavée estompée)
de recouvrement couleur	rosée

Les Roussissures

Position	sur tout le fruit
Intensité	moyenne jusqu'à 1/2

Les lenticelles

Ponctuation	ponctuées
Taille	grandes

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	moyenne à élevée
Acidité	très faible
Astringence	faible
Fermeté de la chair	ferme
Jutosité	moyenne
Texture de la chair	croquante
Épaisseur de la peau	moyenne à épaisse
Nature de la saveur	peu aromatique
Équilibre acide-sucre	douce
Appréciation générale	n.é.

Description de l'arbre

Port de l'arbre	étalé
Vigueur	moyenne
Ramification	moyenne à forte
Densité des brindilles	moyenne à forte
Floraison relative	moyenne à tardive
Charge	importante à très importante
Maturité relative	tardive à très tardive






Remarques :**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Mi-mars en cave naturelle.

Utilisations traditionnelles & conseils :

Bon fruit de table s'apprête bien en conserves

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation (cave naturelle)	

